



ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и
Дальнего Востока Роспотребнадзора

**Эпизоотолого-эпидемиологическая
ситуация
по сибирской язве в азиатской части
Российской Федерации**

З.Ф. Дугаржапова, М.В. Чеснокова, Э.Г. Гольдапель,
С.А. Косилко, Т.И. Иннокентьева, С.В. Балахонов


Цель работы:

Анализ эпизоотолого-
эпидемиологической ситуации
по сибирской язве в азиатской части
Российской Федерации


СИБИРСКАЯ ЯЗВА В СИБИРСКИХ ГУБЕРНИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ



СИТУАЦИЯ ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1930-1980 ГГ.




В АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РФ ВСЕГО УЧТЕНЫ 7201 СНП И 557 СИБИРЕЯЗВЕННЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ И СКОТОМОГИЛЬНИКОВ





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ ПУНКТОВ ПО СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Западная Сибирь
4864 СНП
1,9 ед/тыс. кв.км



Восточная Сибирь
1827 СНП
1,1 ед/тыс.кв.км





Дальний Восток
522 СНП
0,08 ед/тыс. кв.км



СИБИРСКАЯ ЯЗВА У ЖИВОТНЫХ В АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РФ (1985-2016 ГГ.)




СИБИРСКАЯ ЯЗВА СРЕДИ ЛЮДЕЙ В АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РФ (1985-2016 ГГ.)



Выделение сибиреязвенного микроба (*B. anthracis*) и его ДНК в азиатской части РФ



Территориальное районирование азиатской части Российской Федерации по степени эпизоотолого-эпидемиологического неблагополучия по сибирской язве (1985-2016 гг.)



Заключение

- ✖ 1. Сибирская язва укоренилась и распространилась в азиатской части страны, большая часть почвенных очагов сибирской язвы сконцентрирована в южной части Сибири и Дальнего Востока. Преобладание спорадических проявлений эпизоотического процесса обусловлено низкой плотностью населения и пастбищным выпасом скота.
- ✖ 2. Эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в азиатской части Российской Федерации на современном этапе характеризуется:
 - ✖ - неравномерностью территориального распределения с выраженным неблагополучием в районах Крайнего Севера и южных субъектах региона;
 - ✖ - преобладанием старых неманифестных СНП (98,9 %); эпизоотий с эпидемическими осложнениями (82,5 %);
 - ✖ - доминированием удельного веса заболеваний оленей (80,2 %) над другими видами СХЖ.
 - ✖ - основная доля заболеваний отмечалась среди непривитого против сибирской язвы (100 %) сельского населения (97,5 %), мужского пола (77,5 %), трудоспособного возраста;
 - ✖ - заражение происходило при вынужденном убое скота (90,5 %), с преобладанием кожной формы болезни (82,5 %) и контактного пути (86,7 %) передачи возбудителя;
 - ✖ - преобладающими факторами передачи *B. anthracis* служили кровь, мясо и мясопродукты (97,5 %).
 - ✖ - Заболеваемость людей относилась к непрофессиональной группе приусадебного типа животноводческого подтипа (95,0 %).
- ✖ 3. События 2016 г. в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердили необходимость эффективного межведомственного взаимодействия и оптимизации нормативного законодательства по утилизации СХЖ, ревизии состояния сибиреязвенных захоронений.

A landscape photograph featuring three tall, dark wooden poles standing vertically in a grassy field. The background shows rolling hills under a bright blue sky filled with large, white, fluffy clouds. A small white streak, possibly a comet or a fast-moving object, is visible in the upper left portion of the sky. The text "Благодарим за внимание!!" is overlaid in yellow across the middle of the image.

Благодарим за внимание!!

'04 8 18